



When
Quality
Matters



JAMMA

For veterinary medicine industry

شركة غاما

لصناعة الأدوية البيطرية والمتممات العلفية

تهدف لتقديم أدوية بيطرية و متممات علفية عالية الجودة
لضمان دعم تطور الثروة الحيوانية. (دواجن - مجترات)
من المركز الرئيسي في محافظة حماه مدينة السلمية تصل منتجاتنا لكافة المحافظات السورية .

ABOUT US :

Jamma Company aims to provide high quality veterinary medicines and feed supplements to ensure that livestock development is supported.

(Poultry - Ruminants)

From the main center in Syria, Hama, the city of Salamiyah
our products reach all the Syrian provinces .



📍 Syria - Hama - Salamiyah

✉️ info@jamma-vet.com

🌐 Jammavet

📞 0936 448000

📞 033 2229992

📞 033 8841000

INDEX



فيتا غام تسمين
مينيرال غام بريمكس



اريثرو غام
انزوغام
فلورو غام
تيلمو غام
غاما بروميكسول
سيبرو غام
غاما سيبروكول
غاما إنتروسيل
غاما كوليبلوكس
فوسفو غام
ديكلاد غام
تولترا غام
نيستا غام
غاما ليفانيد
ماكسي غام
غاما انتي توكس
غاما اي سيلينيوم
فيتا غام



اموكسي غام
امبي غام
سيفا غام
نيو غام
اوكتسي غام
جنتا غام
كولي غام
سترربتو غام
غاما اسببي سي
غاما فوسفاتال
دوكتسي غام
اريثرو غام 50
غاما كوكس
غاما أموكتسيكول
غاما أمبيكول
غاما اسكوبار
غاما ه+سيلينيوم
جنتا دوكسي غام
غاما نiodوكس
غاما بروكوتيد

Experts in the
veterinary
medicines
industry

تصنيفات الأدوية :

بودرة

تنفسى - معدنى - خافض حرارة - مقويات - تشاركي

سائل

تنفسى - معدنى - طاردديدان - مقويات - تشاركي

علفي

مقويات

POWDER

respiratory-Intestinal-Antipyretic-Tonics-multi use

LIQUID

respiratory-Intestinal-Anthelmintic-Tonics-multi use

FEED

Tonics



JAMMA COMPANY
For Veterinary Medicine Industry

Amoxi Jam



اموكسي غام

التركيب :

يحتوى كل 100 غ على:
اموكسيسللين تريهيدرات 50 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب :

يسخدم اموksi غام للعلاج من امراض الاجزاء التنفسية والهضمية والبولية في الدواجن والماجول، الحملان الناجمة عن الاصابة بالبكتيريا سالبة و ايجابية الغرام مثل (المكورات العنقودية، المكورات العقدية، ال اي كولاي الباستوريلا والسامونيلا) والحساسة لاموكسيسيللين.

ويستخدم للعلاج من امراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسى والجهاز البولى .

التداخل الدوائي

لا يعطى بالمشاركة مع التتراسيكلينات و هاكروليدات و الينكوفايسينات .

مضادات الاستطباب

الحساسية المفرطة للبنسلينات للحيوانات التي تعاني من قصور كلوي او آفات كبدية .

التأثيرات الجانبية :

قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الحيوانات .

طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الفم بعد حلء بهاء الشرب .



الدواجن : 40 غ من المستحضر لكل 200 لتر
من ماء الشرب لمدة 5.4 أيام .

الحملان و العجوول الرضبيعة : 1 غ لكل 50 كغم
وزن حي مرتبة يومياً لمدة 5.4 أيام .

الجرعات ومدة العلاج

فترقة السحب :
اللحم : 6 أيام
البيض : 5 أيام

التحذيرات الأخرى :
يجب عدم اضافة الاعلاج المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوى على العلاج ، لا يعطى للحيوانات المجترة
يستخدم المستحضر المنحل بالماء خلاله 24 ساعة من التحضير

1000 غ

Ampi Jam

أمبي جام

50

التركيب

يحتوي كل 100 غ على:
أمبيسيللين تريهيدرات 50 غ
سواعر حتى 100 غ



الاستطباب

للعلاج من اعراض الجهاز التنفسي، والهضمي و البولي لدى الدواجن
و العجول الحملان و ذلك لفعاليته العالية ضد البكتيريا سالبة و ايجابية
الغرام منه المكورات العنقودية، المكورات العقدية، الاي كوكلاي .
السالمونيلا ، الباستوريلا ، الكلوستريليا ، وغيرها.

مضادات الاستطباب:

الحساسية المفرطة للبنسلينات
الحيوانات التي تعاني من قصور كلوي او افات كبدية.

التداخل الدوائي :

لا يعطى بالمشاركة مع التراسيلينات والماكروليدات واللينكومايسينات .
ارتفاع نسبة الكالسيوم يقلل امتصاص الامبيسيللين.

الآثار الجانبية :

قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الحيوانات .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلها بماء الشرب .

الدواجن: للعلاج 40 غ / 200 لتر من ماء الشرب
لعدة 3 - 5 أيام .

العجول والحملان: 2 غ أمبي جام/100 كغم
من وزن الحيوان الحي في ماء الشرب كل 24 ساعة
لعدة 4 أيام .

**الجرعات
ومدة
العلاج**

فتررة السحب:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م.

اللحم: 6 أيام

البيض: 5 أيام

التحذيرات الأخرى:

يجب عدم اضافة الاهلام المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوى
على العلاج ، ليعطى للحيوانات المجترة
يستخدم المستحضر المنحل بالماء خلال 24 ساعة من التحضير

1000 غ

Cefajam



سيفا غام

التركيب:

يحتوي كل 100 غ على:
سيفالوكسين 20 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

مضاد حيوى واسع الطيف يؤثر بشكوى واسع على الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام مثل (العصيات القولونية، السالمونيلا، الهيبيوفيلس، الكلبيسيلا، الكلوستريديوم، المكورات العنقودية الذهبية)، يمتص السيفالوكسين بسرعة من الجهاز الهضمي وخلال ساعة من الاعطاء يصل الى التركيز الاعظمي في الدم.
يستعمل في معالجة الامراض التي تصيب الجهاز الهضمي والتنفسى والجهاز البولى عند الدواجن.

التدخل الدوائى

اعطاء المستحضر مع الجنثاميسين
يسبب تسمم الكلى.

مضادات الاستطباب

فرط التحسس للسيفالوسپورينات
لا يعطى في حالة القصور الكلوى

التأثيرات الجانبية:

رد فعل تحسسي نسيجي موضعي.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب.

الدواجن: 100 غ / 200 لتر
مع ماء الشرب لمدة 5.3 أيام.

الجرعات
ومدة
العلاج

الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم وجاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فتررة السحب :

اللحم : 5 أيام
البيض : 3 أيام



1000 غ

Neo Jam

نيو غام

50

التركيب

يحتوي كل 100 غ على:
نيومايسين سلفان 50 غ
سواغ حتى 100 غ



الاستطباب:

نيو غام يستعمل عند الدواجن لمعالجة الامراض الناتجة عن الجراثيم سلبية غرام مثل الايكوالاي و السلمونيلا و الهيبيوفيليس و البسددوموناس و لكونه لا يعتص في الامعاء فهو شديد الفعالية في حالات الالتهابات المعموية الدخنومية و الاسهالات الجرثومية المنشأة عند الدخلان و العجول.

مضادات الاستطباب:

الحساسية المفرطة للنيومايسين.
لا يستعمل في حالات الامراض الكلوية.

التدابير الدوائية:

لا يعطى بالمشاركة مع البنسلين لأن ذلك يسبب سوء امتصاص البنسلين.
قد ينقص إعطاء النيومايسين عن طريق الفم من امتصاص فيتامين (K).

الآثار الجانبية:

في حالات نادرة قد يتسبب النيومايسين عند استعماله فمومياً تآثيرات كلوية.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب.

الدواجن: 40 غ لكل 200 لتر ماء شرب

لعدة 5.3 أيام

العجول والدخلان: 2 غ لكل 50 كغم وزن حي

لعدة 4.3 أيام

جرعات
ومدة
العلاج

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و درجة حرارة لا تزيد عن 25° م.

فتررة السحب:

اللحم : 2 أيام.
البيض : 2 أيام.

التذكرة الآخرة:

لا يستعمل أكثر من 5 أيام متتالية.
لا يعطى للحيوانات المجترة.

1000 غ

Oxy Jam



أوكسي جام

التركيب:

يحتوي كل 100 غ على:
أوكسي تراسايكلين هيدروكلورايد 50 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

للعلاج من امراض الاجهزه التنفسية والمعوية لدى الدواجن و العجول و الحملان.
الناجمة عن الاصابة بالبكتيريا سالبة و ايجابية الغرام، مثل: اي كولاي، كامبيلا و باكتر،
الوتديات، هيموفيلس، باستوريلا، سالمونيلا ستافيلوكوكس، ستريلوكوكس، الركتسيا،
و الكلاميديا و المايكوبلازما.

الداخل الدوائي

لا يعطى مع البنسلينات
و السيفالوسبورينات.

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية للتراسيكلينات.
في حالات الاصابات الكبدية.

التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عندالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلها بماء الشرب.

الدواجن: 40 غ لكل 200 لتر

ماء الشرب لمدة 5.3 أيام

العجول و الحملان: 0.5 غ أوكسي جام / 100.50 كغم

من وزن الحيوان في ماء الشرب

الجرعات ومدة العلاج

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فتررة السحب:

العجول و الحملان: 8 أيام.
الدواجن: 6 أيام.

التحذيرات الأخرى:

لا يعطى للدجاج المنتج لبيض المعد لاستهلاك البشري.
يفضل استهلاك الدواء بعد حلها بالماء خلال 12 ساعة.

١٠٠٠ غ



Genta Jam

جنتا جام
50

التركيب

يحتوي كل 100 غ على:
جنتاميسين سلفان 50 غ
سواغ حتى 100 غ



الاستطباب:

الدواجن: يستعمل جنتا جام 50 لعلاج الإلتهابات المعدية المعوية المتسمية من الجراثيم الحساسة للجنتاميسين مثل الإيكولاي و السالمونيلا العجول و الحملان: لعلاج الإلتهابات المعدية المعوية.

مضادات الاستطباب:

يجب عدم استعمال هذا المستحضر للحيوانات التي تعاني من قصور كلوي او اضطرابات سمعية ولا يستعمل في حالات فرط التحسس.

التدابير الدوائية:

لا يعطى مع المدرات البولية ذات السمية الأذنية كالفهورسميد ولا مع البنسلين و الديهييدروستربوتوميسين.

التأثيرات الجانبية:

عند زيادة доза تحدث اضطرابات عصبية ويتأثر العصب السمعي التوازني مما يؤدي إلى عدم قدرة الحيوان على التوازن و عند المعالجة لفترة طويلة قد يحدث قصور كلوي لذا لا بد من التقييد بالجرعة النظامية.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب.

الدواجن: 40 غ من المستحضر لكل 200 لتر
ماء الشرب لمدة 4 - 5 أيام.

العجول و الحملان: 1 غ من المستحضر لكل 50 كغم
من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3 - 4 أيام.

**الجرعات
ومدة
العلاج**

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم وجاف
وبدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فتررة السحب:

اللحم والبيض: 5 أيام

التحذيرات الأخرى:

لا يعطى للمجراثات الكبيرة.

1000 غ

Coli Jam



كولي جام

التركيب :

يحتوي كل 100 غ على :
كولستين سلفان 50 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب :

مضاد حيوي يستعمل في حالات الامراض الناتجة عن البكتيريا سالبة الغرام . عند الدواجنة و العجول و الحملان ، خصوصاً في حالة الإصابة بالالتهابات المعدية المعوية التي تسببها الإي كولي و الكلبيسيلا و السالمونيلا و الباستوريلا و البسوودوموناز .

التدابع الدواوي

عند الاستطباب بالمرخيات العضلية (كالجالامين والتوبيركوراريت وغيرها) فقد يحصل زيادة في التثبيط العضلي العصبي مع خطر حدوث شلل تنفسى .

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية للكولستين .

الآثار الجانبية :

عند الإفراط في الجرعة فإنه اضطرابات هضمية عابرة كالنفاذ و لين البراز و علامات منه تسعم عصبي و بولي قد تظهر .

طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب .

الدواجنة : 40 غ من المستحضر لكل 200 لتر ماء الشرب لمدة 4 - 5 أيام .

الحملان و العجول الرضيعة : 1 غ لكل 50 كغم وزن حليب يومياً لمدة 4.3 أيام .

الجرعات و مدة العلاج

● الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف .
و درجة حرارة لا تزيد عن 25°C .

● فترة السحب :

اللحم و البيض : 2 يوم .

● التحذيرات الأخرى :
لا يستعمل لعلاج العجول و الحملان لمدة تزيد عن 4 أيام متتالية .
لا يعطى للحيوانات المجترة .
يستعمل المستحضر المنحل بالماء خلال 24 ساعة من التحضير .



1000 غ

Strepto Jam

ستربرتو غام 50

التركيب ←

يحتوي كل 100 غ على:
50 غ ستربرتو هايسين سلفان
حتى 100 غ سواغ

الاستطباب: يحتوي مستحضر ستربرتو غام على الستربرتو هايسين و الذي ينتمي على مجموعة الامينوغликوزيدات و هو مضاد حيوي محدود الطيف يؤثر على الجراثيم سلبية الغرام يستخدم للقضاء على الجراثيم المعوية و العصيات القولونية، الباستوريلا، السالمونيلا، الكلبسيلا و المكورات العنقودية و المطبيات لدى الدواجن.

مضادات الاستطباب: فرط الحساسية للأمينوغликوزيدات (ستربرتو هايسين). اضطرابات كبدية او كلوية.

التدابق الدوائي:

لا يعطى مع السفالوبسبورينات و الكوينيلونات.

الآثار الجانبية: قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الدواجن.

طريقة الاستعمال: عن طريق هاء الشرب.

الدواجن: 40 غم من المستحضر
لكل 200 لتر من هاء الشرب
لمدة 3-5 أيام.

الجرعات
ومدة
العلاج



الحفظ:
يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

التحذيرات الأخرى:
لا يستعمله أكثر من 5 أيام متتالية.

فترقة السحب:
اللحم: 5 أيام.
البيض: 7 أيام.

1000 غ

Jamma Aspi-Ci



غاما اسبي سي

التركيب:

يحتوي كل 100 غ على:
اسبيك سالسيليك اسيد (اسبيرين) 25 غ
فيتامين سي 25 غ
حتى 100 غ سواغ

الاستطباب:

يستخدم غاما اسبي سي في حالات نقص فيتامين سي و لرفع مناعة الجسم ضد الامراض، ايضا يستخدم كمسكن للالم و خافض للحرارة المرافقة لامراض البكتيرية و الفيروسية التي تصيب الطيور و الابقار و الاغنام و الماعز .

التفاعلات الدوائية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

مضادات الاستطباب:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم بعد مزجه بالماء .



الدواجن: 100 غ / 200 لتر ماء شرب لمدة 5.3 أيام .

الابقار: 100 ملغم / كغم وزن حي لمدة ثلاثة أيام .

الخيول: 100.15 ملغم / كغم وزن حي مرتبة يومياً لمدة ثلاثة أيام .

الاغنام و الماعز و الخنازير: 10 ملغم / كغم وزن حي ثلاثة مرات يومياً بعدها ثلاثة أيام .

القطط و الكلاب: 10/ 25 ملغم / كغم وزن حي ثلاثة مرات يومياً لمدة ثلاثة أيام .

الجرعات
و مدة
العلاج

● فترة السحب: لا يوجد

● الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م .

1000 غ

Jamma FosfoTal

غاما
فوسفوتال
25

يحتوي كل 100 غ على:
فوسفومايسين صوديوم 20 غ
تايلوزين طرطرات 5 غ
سواغ حتى 100 غ

التركيب ←



الاستطباب:
تشارك فوسفومايسين مع التايلوزين له فعالية مضادة للجراثيم واسعة الطيف، تؤثر في الجراثيم السالبة والمحوجة الفرام والميكوبلازميا أيضاً. وهذا المستحضر مناسب لعلاج الدوادج والفروج والأمهات من أمراض المتسبيبة عن العايكوبلازما والجراثيم المعوية والمرض التنفسى العزمن الكوريزا والإصابة بالمكورات العقدية ولعلاج الامراض المتسبيبة عن المتعضيات الحساسة للفوسفومايسين و التايلوزين.

مقدار الاستطباب:
فرط الحساسية للمواد الفعالة.
اضطرابات كبدية أو كلوية.

التدابط الدواني:
لا يعطى مع البنسلينات.

التاليرات الجانبية:
لا يوجد ضعف الجرعتات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:
عن طريق الفم بعد حلب بهاء الشرب.

**الدوادج: ماء شرب: 160 ملجم من المستحضر
لكل 1 كغ وزن دي لمدة 7-3 أيام
بما يعادل 100 غ من المستحضر لكل
200 لتر ماء.**

**الجرعات
و لمدة
العلاج**

فترات السحب:
اللحم: 7 يوم.

الحفظ:
يحفظ في مكان مظلم وجاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

التحذيرات الأخرى:
لا يستخدم للحيوانات المعدة.
لا يعطى للبياض المعد انتاجه للاستهلاك البشري.

1000 غ

Doxy Jam



دوكيسي غام

التركيب :

يحتوي كل 100 غ على:
دوكيسي سايكلين هيكلاست 50 غ
سواغ

الاستطباب :

يستخدم في معالجة امراض الجهاز الهضمي والتنفسية والبولي عند الدواجن و العجول و الحملان الناتجة عن الجراثيم إيجابية الغرام و الجراثيم السلبية الغرام خصوصاً في حالات : (حالات الرشح المزمن والتهاب القصبات و الجيوب الأنفية و الاكbias الهوائية، و لمعالجة الكوريزا و الايكولاي و التهاب المفاصد).

الآثار الجانبية

تحسن ضوئي و قد يؤدي إلى فرط النمو (فوق الخمج) للفطور و الباكتيريا غير الحساسة.

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية للتراسيكلينات.
في حالات الإصابات الكبدية.

التدخل الدوائي :

قد ينبعض من مضادات الجراثيم الفاتحة للبكتيريا مثل البنسلينات .
وجود الشوارد لثانية و ثلاثة التكافؤ في الماء و العلف قد ينقص من امتصاص الدوكيسي سايكلين .
لا يستعمل مع مضادات الدموسة و الكاولين .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلء بهاء الشرب

الدواجن : 40 غ من المستحضر لكل 200 لتر
هاء الشرب لمدة 4 - 5 أيام .

العجول و الحملان: 1 غ من المستحضر لكل 50 كغ
هاء الجسم في الشرب لمدة 5 - 7 أيام .

**الجرعات
ومدة
العلاج**

فترة السحب :
يحفظ في مكان مظلم و جاف
اللحم: الدواجن: 7 أيام .
العجول و الحملان: 14 يوم .

التحذيرات الأخرى :
لا يعطى للدواجن للبيض المعد للاستهلاك البشري .
يفضل استهلاك الدواء بعد حلء بهاء خلال 12 ساعة .
لا يعطى للمجررات الكبيرة .



1000 غ

EryThro Jam

اريثرو غام
50

التركيب

يحتوي كل 100 غ على:
اريثرومایسین نیوسیانات 50 غ
سواغ حتى 100 غ



الاستطباب:

يستعمل اريثروغام 50 للعلاج من الالتهاب التنفسى المزمن والرشح المعدى و التهاب التجاويف الأنفية و التهاب الأغشية المخاطية في الدواجن والديك الرومى . و التهاب الرئة و دفتيريا العجول و الالتهاب المعموى الرئوى عند العجول و الحملان .

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية لاماکرولیدات .

التدخلات الدوائية:

لا يعطى بالمشاركة مع التراسيميلينات و الماکرولیدات الأخرى و اللينکومایسین .

التأثيرات الجانبية:

قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الحيوانات .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب .

الجرعات
و مدة
العلاج

الدواجن: 40 غرام لكل 200 لتر ماء شرب
لعدة 3 - 5 أيام .

العجول و الحملان: 1 غرام / 50 كغم وزن حي
لعدة خمسة أيام .

فتررة السحب:

اللحم: 4 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .
البيض: 3 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C .

١٠٠٠ غ

Jamma Cox



غاما كوكس

التركيب:

كل 100 غ يحتوي على:
امبروليلوم هيدروكلورايد
سلفاكينونوكسالين صوديوم
ديافيريدين هيدروكلورايد
فيتامين E 3 ك
سواغات حتى

الاستطباب:

يستخدم مستحضر غاما كوكس كمضاد كوكسيديا حيث يعطى لعلاج كوكسيديا الاعماء والاعورين عند الدواجن خصوصاً (تينيلا، نيكاتريكس، اسبرفولينا، مكسيما، برونيتي.....الخ)

فرط الحساسية للأمبروليلوم أو سلفاكينونوكسالين.
إعطاء التبامين بجرعات عالية قد يقلل فعالية الأمبروليلوم.

مضادات الاستطباب

لا يعطى بالمشاركة مع التبامين.

التدخلات الدوائية

الأثار الجانبية:

فقدان الشهية . الإسهال و لكن بشكل نادر و ربما يرتبط بالجرعة .

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم مع ماء الشرب .

الجرعات
و مدة
العلاج

الدواجن: 100 غ / 200 لتر من ماء الشرب
لمدة 3 أيام ثم يوقف العلاج ليومين ثم يعاد
العلاج لمدة 3 أيام أخرى
او حسب ارشادات الطبيب البيطري

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و درجة حرارة لا تزيد عن 25 م.

فترم العرض:

اللام 5 أيام.

التحذيرات الأخرى:
لا يعطى للدواجن المنتج
ليبيض العاندة .



1000 غ

Jamma Amoxicol

غاما
أموكسيكول
26



التركيب

كل 100 غ تحتوي على:
أموكسيسللين تريهيدرات 20 غ
كوليستين سلفان 120 م.م.د (6 غ)
سواغ حتى 100 غ



الاستطباب:

يستخدم غاما أموكسيكول لمعالجة الالتهابات الناجمة عن الإصابة بالجراثيم الابحابية والسلبية الغرام التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التناسلي عند الدواجن ويفيد في معالجة الإصابة بالسالمونيلا، الكلوستريديا الباستوريلا، التهاب التجاويف الأنفية، التهاب الأكياس الهوائية، المايكوبلازما والتلال المعموية.

مضادات الاستطباب:

الحساسية للأموكسيسللين و/ أو الكوليستين.

التدافع الدوائي:

لا يعطى بالمشاركة مع التتراسيكلينات والماكاروليدات واللينكومايسين.

الآثار الجانبية: لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم بعد حلها بماء الشرب.

الدواجن:

100 غ/200 لتر ماء شرب لمدة 5-3 أيام.

الجرعات
ومنتهى
العلاج

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم وجاف
ودرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فترزة السحب:

اللحم: 7 أيام.
البيض: 5 أيام.

التذبذبات الأخرى:

يجب عدم إضافة الأدواء المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

لا يعطى للحيوانات المجترة.

يستعمل المستحضر المنحل بالماء خلال 24 ساعة من التحضير.

1000 غ

Jamma Ampicol



غاما أمبيكول

التركيب :

كل 100 غ تحتوي على:
أسيتيل سيلين تريهيدرات
كوليستين سلفات
سوانغ حتى

الاستطباب :

الطيور : يستعمل للإصابات البكتيرية الناتجة عن البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام مثل،
الستربتوكوكس، الاستافيلوكوكس، الكورني باكتيريوم، الكلوستروديوم، البايكولاي،
الكلبسيلا، السالمونيلا، البروتيسن و السبوروكتنوزس.
العجوه و الحملان : التهاب الرئة و التهابات الأمعاء للنسفم الدموي الناتج عن السالمونيلا،
تعفنة الظلف، المعددي.

التدخالت الدوائية

مضادات الاستطباب

لا يعطى بالمشاركة مع التتراسيكلينات
فرط الحساسية للبنسلينات و/ او الكوليستين.
و الماكرويلدات و اللينكومايسين.
ضعف الوظيفة الكلوية و الكبدية.

الأثار الجانبية :

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.
طريقة الاستعمال:
يعطى عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب.

الدواجن : 200 غ / 200 لتر ماء الشرب
ل لمدة 5.3 أيام

العجوه والحملان: 1 غ / 10 كغم ماء وزن الحيوان
يومياً لمدة 3 أيام.

الجرعات
و مدة
العلاج



● الحفظ:
يحفظ في مكان مظلم وجاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

● فترة السحب:
اللحوم: 7 أيام.
البيض: 5 أيام.

1000 غ

Jamma Ascopar

غاما
اسكوبار
60

التركيب ←

كل 100 غ تحتوي على:
40 غ باراسيتامول
اسكوربيك اسيد (فيتامين سي) 20 غ
سواغ حتى 100 غ



الاستطباب:

يستخدم مستحضر غاما اسكوبار في الحالات التالية عند الدواجن و الابقار و الاغنام و الطاعز :
كعلاج مساعد في حالة التهاب المفاصل و الإصابة بالرورهازم مسكن للالم و خافض للحرارة في مختلف حالات الإجهاد الناجمة عن الإصابة البكتيرية و الفيروسية و الطفيلية و الظروف الجوية .

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية لحد مركبات المستحضر .

التفاعلات الدوائية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب .

الدواجن: 100 غ / 200 لتر من ماء الشرب يومياً لمدة 4.3 أيام

الابقار: 30 غ / راس مرتبة يومياً لمدة 4.3 أيام

الاغنام و العاوز: 5.3 غ / راس مرتبة يومياً

لمدة 4.3 أيام

الجرعات
ومدة
العلاج

P.S

يستخدم المستحضر المندل بالماء خلال 24 ساعة من التحضير ولا يستعمل عند القطط .

فتررة السحب:

اللحوم: 2 يوم من آخر جرعة متناوله
الحليب و البيض: 1 يوم من آخر جرعة متناوله

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م .

1000 غ

Jamma E+Selenium



غاما ه+سيلينيوم



التركيب :

كل 100 غ تحتوي على :
فيتامين (E) 12 غ
سيلينيوم الصوديوم 0.12 غ

الاستطباب :

يعطى في حالات نقص فيتامين ه او السيلينيوم خصوصاً في الدواجن
والعجول و الحملان .
في الحيوانات الكبيرة يعطى في حالات انخفاض الخصوبة عند الذكور و الإناث و اعتلال
العضلات و ضمورها (مرض العضلات البيضاء) و يعطى للدواجن في حالات انخفاض
إنتاج البيض و انخفاض نسبة التفريخ في دجاج الامهات و لينة الدجاج
(مرض الصوص المجنون)
ومرض الارتشاح تحت الجلد و مرض ضمور العضلات عند الصيصان و الرومبي .

التدخلات الدوائية

لا يوجد

مضادات الاستطباب

زيادة استهلاك السيلينيوم يؤدي إلى
ترسيبها في البيض مما يؤدي إلى
انخفاض نسبة المفسن

الآثار الجانبية : لا يوجد

طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب .

الدواجن: 200 غ / 200 لتر
من ماء الشرب لمدة 5.3 أيام .
الابقار : 5.3 غ / راس لمدة 3 أيام .
العجول و الحملان : 2 غ / راس لمدة 3 أيام .

الجرعات و مدة العلاج

● الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م .

● فترة السحب :

لا يوجد



1000 غ

Genta Doxy Jam

جنتا
دوкси غام
25

الاستطباب :

لمعالجة الامراض التنفسية (المرض التنفسى المزمن التهاب الجيوب).
التهاب القصبات و الاكbias الهوائية)
لمعالجة الإنفلونزا المعموية المتنسبية بالجراثيم سلبية الغرام
(العصيات القولونية - سالمونيلا)
عدوى المفاصل بالمعكرونة العنقودية و العقدية.

مضادات الاستطباب :

فرط التحسس لمجموعة التراسيلينات و الاعينوجلايكوزيدات.
التهاب الكلية ، و التهاب الكبد الحاد.

التفاعلات الدوائية :

لا يعطى بالمشاركة مع البنسلينات و السيفالومسيورينات
و البوليميكسينات.

التأثيرات الجانبية :

تفاعلات فرط الحساسية.
قد يؤدي التطبيق المطبوخ للجرعات العالية إلى تسسم عصبي
أو تسسم اذني أو تسسم كلوي.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب.

الجرعات
ومدة
العلاج

100 غ / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 . 5 أيام متتالية
يعطى عند استقبال الصيادلة وفي بداية الأسبوع
الرابع من العمر .
يمكن إعطاؤه في وقت لاحق عند التعرض لاجهاض
أو اعراض اخرى و بنفس الجرعة لمدة 24 - 48 ساعة.

الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 م.

فتررة السحب :

اللحم: 8 أيام
البيض: 3 أيام



1000 غ

Jamma Neodox

20

غاما نيو دوكس

التركيب:

يحتوى كل 100 غ على:
نيوهاسين سلفات
دوكسي ساركلين هيدروكلورايد
سواغ حتى

الاستطباب:

يسعى غاما نيو دوكس عند الدواجن في علاج التهابات الجهاز التنفسية والتهاب الأمعاء والاسهالات والإصابات الأخرى المترتبة عن الجرائم الجراثيمية والسلبية الغرام مثل السالمونيلا، البايكولاري والعايكوبلازما. وأيضاً في معالجة الإصابات الناتجة عن الليتوسبريا، التوكسوبلازما.

الحساسية المفرطة للتراسكلينات والأمينوغليكوزيدات.
الحيوانات التي تعاني من قصور كلوي أو آفات كبدية.

مضادات الاستطباب:

لا يستخدم مع العلف الحاوي
على نسبة عالية من الكالسيوم.

التفاعلات الدوائية:

التآثرات الجانبية:
لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:
عن طريق الفم مع ماء الشرب.

الجرعات ومنصة العلاج

الدواجن: 100 غ / 200 لتر ماء الشرب
لمدة 5-3 أيام.
أو حسب إرشادات الطبيب البيطري

فتررة السحب:
اللحم والبيض:
7 أيام من آخر جرعة متناوله

الحفظ:
يحفظ في مكان مظلم وجاف
ودرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.



1000 غ

غاما بروكوتيد 71

Jamma Brocotid

التركيب ←

كل 100 غ تحتوي على :
دوкси ساينكلين هيدروكلورايد 40 غ
تايلوزين طرطان 20 غ
كولستيت سلفات 10 غ
بروموكسيت هيدروكلورايد 1 غ
سواغ حتى 100 غ



○ الاستطباب : يستعمل لعلاج الالتهابات الجرثومية التي تصيب الجهاز التنفسى والجهاز المعدى المعموى و الجهاز البولى و التناسلى و خاصة ضد العصيات الكولونية و السالمونيلا و الشيجيلا و العايكوبلازما و الزانفة الزنجارية و الكلبيسيلا الرئوية و بعض الريكتسيات و الكلاميديا عند الدواجن.

○ مضادات الاستطباب : الحساسية المفرطة للتراسكلينات و الماكروليدات و الكولستيت.

الحيوانات التي تعاني من قصور كلوي او افات كبدية .

○ التفاعلات الدوائية : لا يعطى بالمشاركة مع البنسلينات و السيفالوسبيورينات .

○ الآثار الجانبية : لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

○ طريقة الاستعمال : عن طريق الفم مع ماء الشرب .

الدواجن : 50 غ / 200 لتر ماء الشرب
لمدة 5.3 أيام .

الجرعات
و مدة
العلاج

P.S

○ يستعمل المستحضر المنحل بالماء خلال 24 ساعة من التحضير .

○ فترة السحب : اللحم : 4 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .
البيض : 3 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .

○ التحذيرات الأخرى : لا يعطى لغير الحيوانات الموصى بها .

○ الحفظ : يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C .

1000 غ

Erythro Jam

سائل عن طريق الفم

اريثرو غام

20



يسعدك اريثرو غام للعلاج من الالتهاب التنفسى المزمن والرشح المعدى والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأغشية المخاطية في الدواجن والديك الرومي.

و التهاب الرئة و دفتيريا العجول و الالتهاب المعموى الرئوي عند العجول و الحملان.

التدابع الدوائى

لا يعطى بالمشاركة مع التراسيميلينات
و الماكروبليدات الأخرى و اللينكوميسين.

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية للماكروليدات.

التأثيرات الجانبية:

قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الحيوانات.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب.

الدواجن : العلاج : 100 مل لكل 200 لتر ماء شرب

لمدة 3 أيام.

العجول والحملان: 1 مل / 10 كغ وزن حي

لمدة خمسة أيام.

الجرعات
ومدة
العلاج

فتررة السحب:

اللحوم: 3 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله.

البيض: 6 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله.

التحذيرات الأخرى:

لا يعطى لغير الحيوانات الموصى بها.

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL SOLUTION

Enro Jam



التركيب

يحتوي كل 100 غ على :
10 غ انزوفلوكساسين
100 مل سواغ حتى

الاستطباب :
يستخدم إنرو جام للعلاج و المقاية من اغلب الامراض و الالتهابات التي تصيب الأجهزة التنفسية و المضمية و البولية و التناسلية عند الدواجن و العجول و الحملان و الناتجة عن الإصابة بالجراثيم إيجابية و سلبية الغرام مثل الستربيتوكوكس والمعصيات القولونية و السالمونيلا و الهيماوفيلوس و الميكوبلازما (CRD) و كوليرا الطيور و التهاب السرة .

مضادات الاستطباب :
لا يعطى في حال وجود اضطرابات وظيفية كبدية ، او التحسس المفرط تجاه الإنزوفلوكساسين او احد افراد عائلة الفلوروكينولون .

التداء الدوائي :
لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

التأثيرات الجانبية :
قد تظهر اعراض فرط حساسية عند الحيوانات .

طريقة الاستعمال :
يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب .

الدواجن : للوقاية : 50 مل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام .
العلاج : 100 مل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام .
في حالة الإصابة بالسلمونيلا يستمر العلاج لمدة خمسة أيام .
العجول و الحملان : 2.5 - 5 ملغر / كغم وزن هي لمدة خمسة أيام .

**الجرعات
والمدة
العلاج**

الحفظ :
يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C .

فترقة السحب :
اللحم : 7 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .
البيض : 3 أيام بعد آخر جرعة دوائية متناوله .

التحذيرات الأخرى :
لا ينصح بإضافته إلى مياه الشرب التي تحتوي
على مستحضرات الاملام المعدنية .

1000 ml

Floro Jam

سائل عن طريق الفم

فلورو غام
10



○ التركيب :

كل 100 مل يحتوي على:
فلورفينيكول 10 غ
سواغ حتى 100 مل

الاستطباب

فلورو غام مضاد حيوي واسع الطيف للعلاج من أمراض الجهاز التنفسية والجهاز الهضمي لدى الدواجن (الرشد المزمن المعقد، التهاب الامعاء) و التي تسببها: الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول مثل العصيات الكولونية، الباستوريلا، المكورات العقدية، والسلالمونيلا.

التأثيرات الجانبية

قد يحدث انخفاض في استهلاك الطعام والماء وتليّن عابر للبراز او الإسهال خلال فترة العلاج.

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية للفلورفينيكول.
لا يعطى للحيوانات المجترة.

○ التداخل الدوائي :

لا يعطى مع البنسلينات.

○ طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب.

الدواء:

للعلاج: 200 مل / 200 لتر ماء شرب
ولمدة 3 - 5 أيام.
(ما يعادل 20 ملغم / كغم من وزن الجسم).

الجرعات
ومدة
العلاج

○ فترة السحب:

لاحل اللحم:
الدواجن: 7 أيام.

○ التحذيرات الأخرى:

لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري.

○ الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم وجاف
ودرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Tilmo Jam



الاستطباب:

يُستعمل مستحضر تيلمو جام 25 عند الدواجن لمعالجة الامراض التنفسية التي تسببها المفطورات (ميكونوبلازما جاليسكتوم ، و ميكونوبلازما سينوفي) وكذلك الاورنيلوبكتيريوم رينوتريكيالي و عند العجول و الحملان لمعالجة امراض جهاز التنفس التي تسببها الجراثيم السلبية و ايجابية الغرام الحساسة للتيلميوكوزين (اكتينوباسيللوس بليورينيومينا ، الميكوباكتريريوم).

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية للتيلميوكوزين.

التفاعل الدوائي:

لا يعطى بالتزامن مع الماكروليدات الاخرى او اللينكوهاسيتين.

التأثيرات الجانبية والسمية:

لا يوجد عند اعطائه ضمن الجرعة المحددة.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بهاء الشرب.

فتررة السحب:

اللحم : 12 يوم بعد اخر جرعة دوائية متناوله .

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 م.

الدواجن: 75 مل من المستحضر لكل 200 لتر من هاء الشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية.

يعطى عند استقبال الصيستان . و في بداية الأسبوع الرابع من العمر يمكن اعطاؤه في وقت لاحق إذا تعرض الطير لاجهاض او امراض اخري . و بنفس الجرعة لمدة 24-48 ساعة .
العجول و الحملان: 3 مل لكل 25 كغ يومياً لمدة 3-5 أيام .

الجرعات
و مدة
العلاج

! لا يستعمل للدجاج المنتج لبيض الماندة .

لا يسمح للذبيه ، و غيرها من افراد الفصيلة الخيلية بالإقتراب من الماء الداوى على التيلميوكوزين .

قد يسبب تهيجاً او حساسية بال接觸 مع الجلد ، لذلك يجب تجنب ملامسته المباشرة مع الجلد ، و يجب ارتداء افروف وكفوف عند خلط المنتج والتعامل معه ، مع غسل اليدين بعد التعامل معه ، و كذلك غسل الاجزاء من الجلد التي تتماس معه مباشرة .
يمنع تجميده .

Warnings

1000 ml

Jamma Bromixol

سائل عن طريق الفم

غاما
بروميكسول
3

○ التركيب :

كل 100 مل يحتوي على :
برومهكسين هيدروكلوريدا 1 غ
هنتوك 2 غ
حتى 100 مل سواغات

الاستطباب

يسعمل بروميكسول في حالات التهابات الجهاز التنفسي التي يصاحبها وجود كمية كبيرة من الافرازات المخاطية عند الدواجن و الابقار الاغنام و الخيوط حيث يقلل من لزوجة المفرزات و يخفف من الاحتقان في الرئتين و الجيوب .

كما يوصف كعلاج مساعد في حالات الإصابة بالبوري كولاي و التهابات الجيوب و الشعب الهوائية المعددي و النزلات الرئوية وفي حالات التهاب القصبات الحاد و المزمن عند الدواجن و التهاب الجيوب و انفلونزا الخيوط و جميع الإصابات التنفسية عند الخيل و الابقار و الاغنام .

مضادات الاستطباب لا يوجد عند الالتزام بالجرعة الموصى بها .

التأثيرات الجانبية لا يوجد .

○ التداخل الدوائي : لا يوجد .

○ طريقة الاستعمال : عن طريق الفم مع ماء الشرب .

الدواجن: 50مل/200 لتر من ماء الشرب لمدة 5.3 أيام .

الحيوانات الكبيرة (ابقار، خيول، اغنام) :

1 مل/1 كغ وزن حي لمدة 5.3 أيام .

او حسب ارشادات الطبيب البيطري

الجرعات
ومدة
العلاج

○ فترة السحب :

الحليب : 3 أيام . البيض : 1 يوم .

اللحم : 3 أيام .

○ الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C .



1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Cipro Jam



10

سيبرو جام

سائل عن طريق الفم

الاستطباب:

لعلاج انتانات الاجهزة التنفسية، والهضمية، والبولية، عند الدواجن العجول،
والحملات، و الناجمة عن: الإي كولي، الرشن المزمن، المايكوبلازما،
الكوريزا، التهاب السرة و كيس المعد كوليرا الطيور، الباستوريلا، السلمونيلا،
الانتيروكسيديا، النزلات المعموية و الإسهالات.

مضادات الاستطباب:

لا يعطى للدواجن المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري.
فرط الحساسية لسيبروفلوكساسين.

لا يعطى للحيوانات التي تعاني من ضعف شديد في الكبد و الكلي.
لا يعطى للحيوانات الحامل او المرضعة او التي تملك نشاط ميكروبي نشيط.

التفاعل الدوائي:

بنعارض تطبيقه مع التراسيكلينات و الماكروليدات و الكلورامفينيكول.

التأثيرات الجانبية:

الإعطاء للحيوانات الصغيرة خلال النمو يمكن أن يسبب آفات الغضروف
في المفاصل.
تفاعلات فرط الحساسية.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب.

الدواجن:

50 مل لكل 200 لتر ماء شرب ولمدة 3 - 5 أيام.

العجول والحملات:

3 - 5 مل / 1 كغم من وزن الجسم مرتبة يومياً ولمدة 3 - 5 أيام.

الجرعات
ومدة
العلاج

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فترقة السحب:

اللحم : 7 أيام.

Jamma Ciprocol

سائل عن طريق الفم



غاما سيبروكول 15

التركيب:

كل 100 مل يحتوي على:
 سبورة فلوكساسين 10 غ
 كولاستين سلفات 100 م.م.د (5 غ)
 سواع حتى 100 مل

፩፻፲፭

يُستخدم في علاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسية والبولي الناجمة عن الإصابة بالجراثيم الحساسة للكولستين و السيربروفلوكساسين (إيكولاي - هيدروفيليس - هايكوبلازما - الباستوريلا - السالمونيلا) عند الدوادين و المبطان و العجدول .

مصادفات الاستطباب:

- لا يعطي للدواجن المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري .
لا يعطي في حال اضطراب وظائف الكبد والكلية .

الثانية عشر

لا يوجد عند الالتزام بالحدائق الموصى بها.

الداخل الدوالي

لا يوجد عند الالتزام
بالدروس الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

لعله عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب.

الدجاج: 100 مل لـ 200 لتر من ماء الشرب
لمدة 5-3 أيام متالية.

**في حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لمدة 5 أيام .
العجوول و الحملات : 1 مل للك 25 كغم من وزن الجسم
في ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام .**

الجرعات
ومدة
العلاج

فترة السحب:

لهم : 12 يوم.

البيض : لا يصلح للاستهلاك السكري أثناء المعالجة .

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بعيدة عن الحرارة لا تزيد عن 25° م

1000 ml
JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Jamma Introcil



غاما إنتروسيل

سائل عن طريق الفم

الاستطباب:

يستخدم مسحوق غاما إنتروسيل لعلاج إصابات الجهاز الهضمي الناجمة عن الجراثيم الحساسة للكوليستين أو السبيكتينومايسين مثل المايوكوبلازما والسامونيلا والاكولاري والهيتموفيلس عند صغار الماعز (الجدايا) والحملان والعجول وذلك في حالات الإسهاب الشديد والديستريا والباراتيفونيد.

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية تجاه السبيكتينومايسين أو الكوليستين.

يجب تجنب إعطائه للحيوانات التي تعاني من مشاكل في الوظيفة الإطرافية وتجنب إعطائه للحيوانات ذات الهضم الميكروبيولوجي الفعال (المجراثات الكبيرة).

التفاعل الدوائي:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد هزجه بالماء.

الجرعات
وعدد
العلاج

صغار الماعز و الحملان و العجول :
1 مل/ 3.25 كغ وزن حي مرتبه يومياً لمدة ثلاثة أيام.
أو حسب إرشادات الطبيب البيطري .

فتردة السحب: 7 أيام

الحفظ: يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

1000 ml

Jamma Coliflox

سائل عن طريق الفم

غاما
كوليفلوكس
16



التركيب :

كل 100 مل يحتوي على :
انزوفلوكساسين 10 غ
كولستين سلفات 6 غ
سواغ حتى 100 مل

الاستطباب :

يوصى باستخدام مستحضر غاما كوليفلوكس لمعالجة إصابات الجهاز الهضمي، التنفسى و البولى المنسوبة عن الجراثيم الحساسة للكولستين و الانزوفلوكساسين مثل الكامببيلوباكتر، الايكو ولاي، الهايموفيليس، الهايكوبلازما، الباستوريلا و السالمونيلا عند الطيور.

مضادات الاستطباب :

- حالات الحساسية للكولستين و الانزوفلوكساسين او لكن منهما على حدة.
- لا يستخدم في حال الحيوانات التي لديها مشاكل في الكبد او الكلى.
- حالات المقاومة البكتيرية للفلوروكينولونات او الكولستين.
- لا يعطى للدجاج المنتج لبيض العاندة او الحيوانات المنتجة للحليب او الدوامد.
- لا يعطى هذا المستحضر بجرعات تحت علاجية او جرعات وقائية.

التداخل الدوائي :

لا يوجد عند الالتزام بطريقة الاستخدام و الجرعات الصديحة.

التأثيرات الجانبية :

- كل مجموعة الفلوروكينولون لها القدرة على ان تسبب آفات مفصليية عند صغار الحيوانات.
- يمكن ان تظهر تغيرات هضمية مثل تجمّع الغازات ، اسهال خفيف ، اقياء.
- يمكن ان يظهر اضطرابات في الجملة العصبية.
- الناء، فترة النمو يمكن ان يؤثر الانزوفلوكساسين على غضاريف المفاصل.

طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب.

الدواجن :

100 مل / 200 لتر ماء شرب لمدة 5.3 أيام.

الجرعات
ومدة
العلاج

فترة السحب :

اللحم : 12 يوم.

الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م.

1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Fosfo Jam



20

فوسفو جام

سائل عن طريق الفم

الاستطباب:

يستخدم مستحضر فوسفو جام 20 % لمعالجة إنتانات الجهاز الهضمي التي تسببها الجراثيم سلبية و إيجابية الغرام لدى الدواجن مثل : (الإيشرشيا كولي، الباستوريلا، البروتيسن، المستديمية، المكورات العقدية، المكورات العنقدودية، والوتديات المقحية، السالمونيلا) . و ذات تأثير خاص على الإيشرشيا كولي والسالمونيلا .

مكونات الاستطباب:

مرط الحساسية للفوسفومايسين.

التفاعل الدوائي:

يتآثر مع البنسلينات و السيفالوسپورينات و الامينوغليكوزيدات و الاريلوهمايسين و التراسكلينات .

تأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب .

الجرعات
ومدة
العلاج

للدواجن: 40 ملغم مادة فعالة / كغم من وزن الجسم .

أي ها يعادل:

150 مل لكل 200 لتر ماء شرب ولحدة 3 - 5 أيام .

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م .

فتررة السحب:

اللحظ: 7 أيام .

Warnings

بحضر الدواء يومياً بهاء جديد ونقفي .

إن شهوارد المعادن الثقيلة الموجودة في الماء الذي يحل فيبه الدواء باكثر من 1000 جزء بالمليون توفر و تقلل من قابلية الدواء للذوبان .

1000 ml

Dicla Jam

سائل عن طريق الفم



ديكلا غام

2.5

التركيب :

كل 100 مل تحتوي على:

ديكلازوريل
سواغ حتى 100 مل

الاستطباب :

يعطى ديكلا غام 2.5 % للعلاج من داء الكوكسیديا عند دجاج اللحم (اسيرفولينا و ايميريا هاكسيسما و ايميريا ميفاتي و ايكتريكس و ايميريا تينيلا و ايميريا مينيس) و الرومي (ايميريا غالوبافونيس و ايميريا ادينويدس و ايميريا ميلاغريتيس و ايميريا ديسبيرسا).

مضادات الاستطباب :

يمنع استخدامه للدواجن المنتجة للبيض.
لا يعطى مع مضادات الكوكسیديا الأخرى.

التداخلات الدوائية :

لا يعطى مع مضادات الكوكسیديا الأخرى.
يمكن إعطائه مع الإضافات العلفية او الأدوية الأخرى.

التأثيرات الجانبية :

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم مع ماء الشرب.

الدواجن : 100 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب.
لمدة 48 ساعة.

في الحالات الشديدة: 200 مل من المستحضر
لكل 200 لتر من ماء الشرب، لمدة 48 ساعة.
او حسب إرشادات الطبيب البيطري.

الجرعات
ومدة
العلاج

الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °C.



1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Toltra Jam 2.5



التركيب

كل 100 مل تحتوي على:
2.5 غ تولترازوريل
100 مل سواغ حتى

تولترا جام مضاد للكوكسيديا واسم الطيف يستخدم في علاج إصابات الكوكسيديا لدى الدواجن المتنفسة عن:

- أيميريا تينيلا.
- أيميريا نيكاتريكس.
- أيميريا اسبروفولينا.
- أيميريا ماكسيما.

○ مضادات الاستطباب:

لا يستخدم للدواجن المنتجة للبيض المعذ لاستهلاك البشري.
لا يستخدم خلال 14 يوم قبل إنتاج البيض.

○ التفاعلات الدوائية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

○ التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

○ طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلته بماء الشرب.

الدواجن: 7 ملخ تولترازوريل / 1 كغ من وزن الحيوان مع
ماء الشرب لمدة يومين متتاليين. أي ما يعادل 28 مل / 100 كغ
من وزن الحيوان لمدة يومين متتاليين مع ماء الشرب أو
200 مل / 200 لتر من ماء الشرب لمدة يومين متتاليين.

الجرعات
ومدة
العلاج

الحفظ:

| يحفظ في مكان مظلم وجاف
| ودرجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فتررة السحب:

| اللحم: 21 يوم.

1000 ml

Nysta Jam

سائل عن طريق الفم

نيستا غام

40



○ التركيب :

كل 100 مل يحتوي على:
نيستاتين 40 م.م.د
سوافر حتى 100 مل

الاستطباب

يستخدم نيستا غام في معالجة الإصابات الفطرية عند الدواجن التي تصيب القناة الهضمية والاغشية المخاطية و خاصة فطور الكانديدا والاسبرجيللوس مما يؤدي بالنتيجة إلى تحسين الاستفادة من العلف المستهلك.

○ مضادات الاستطباب : الحساسية تجاه النيستاتين .

التأثيرات الجانبية

لا يوجد عند الالتزام
بالجرعات الموصى بها .

التدابع الدولي

لا يوجد عند الالتزام
بالجرعات الموصى بها .

○ طريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الفم بعد حلها بهاء الشرب .

الدواجن:

للعلاج : 100 مل / 200 لتر هاء الشرب و لمدة 3 - 5 أيام .
للوقاية : 50 مل / 200 لتر هاء الشرب و لمدة 5-3 أيام .

الجرعات
والمدة
العلاج

○ فترة السحب : لا يوجد

○ الحفظ :

يحفظ في مكان هظيم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م.

1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Jamma Livanid



9

اغاما ليفانيد

سائل عن طريق الفم

الاستطباب:

اغاما ليفانيد طارد للديدان واسم الطيف يستعمل عند المجررات (اغنام، هاعز، ابقار، جمال) لمعالجة الديدان الاسطوانية: هيمونكس، اوسترتاجيا، نيماتودirus، كوبيريا و الديدان الشعريه الاسكاريس الديدان الرئويه: ديكوكوكلاس - الاطوار البالغة للوريقه الكبدية و الفاشيولا.

مضادات الاستطباب:

لا يعطى للحيوانات التي لديها مشاكل كبدية.
لا يعطى مع البرانتيك، المورانتيل و مركبات الفوسفور العضوية.

التفاعل الدوائي:

لا يوجد عندالتزام بالجرعات الموصى بها.

التأثيرات الجانبية:

الجرعة الزائدة يمكن ان تسبب هيجان، تعرق، سعال، اقياء، سيلان لعاب، مغص، فرط تنفس و تقلصات.

طريقة الاستعمال:

يعطى بالتجري姆 عن طريق الفم.

الجرعات
ومدة
العلاج

الاغنام و الماعز: 1 مل/4 كغم وزن دي
الابقار و العجول و الجمال: 25 مل/100 كغم وزن دي
او حسب ارشادات الطبيب البيطري.

الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و درجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

فترة السحب:

لحm : 28 يوم
الحليب : 4 أيام

1000 ml

Maxi Jam

سائل عن طريق الفم

ماكسي
غام



○ التركيب : كل 1000 مل تحتوي على :

فيتامين(A) بالميقات 20 م.م.د	ارجينين 1300 ملغم	حمض الاسبارتيك 0.55 غ
فيتامين(D3) 2 م.م.د	سيستين 240 ملغم	حمض الفلوتاميك 3360 ملغم
فيتامين(E) اسيتات 8000 ملغم	تيروزين 1360 ملغم	لايسين 440 ملغم
فيتامين(K3) 12.250 ملغم	فالين 1240 ملغم	ليوسين 1120 ملغم
فيتامين(S) 10000 ملغم	سيبرين 5000 ملغم	ليوكس 700 ملغم
فيتامين(B1) 3000 ملغم	غلابيسين 900 ملغم	ميثيونين 1060 ملغم
فيتامين(B2) 2400 ملغم	برولين 1780 ملغم	حديد 100 ملغم
فيتامين(B6) 1300 ملغم	فينيل الانيت 1100 ملغم	نحاس 10 ملغم
فيتامين(B12) 6 ملغم	كوبالت 1000 ملغم	فلافونوكس 5 ملغم
فيتامين(B) 1200 ملغم	هيسنتيدين 80 ملغم	منغفيز 350 ملغم
باتوكينيك اسيد 6000 ملغم	ايزوميلوسين 1100 ملغم	ماغنيزيوم 2500 ملغم
تربيوفان 300 ملغم	ثيروتين 680 ملغم	بيود 5 ملغم
الانيت 1300 ملغم	سواغ حتى 250 ملغم	زنك 1000 ملغم

الاستطبابات

ماكسي غام هرزيج متكامل من الفيتامينات و الدموض الاهمية و الاملاح قابل للانحلال في الماء ينشط و يحفز الاستقلاب و المقاومة ضد الاهراص في الحيوانات و يساهم في عمليات إزالة السموم الكبدية و يعوض نقص الفيتامينات الناجم عن استعمال المضادات الحيوية و الادوية الكيميائية الاخري و طاردات الديدان.

○ مضادات الاستطباب / التداخل الدوالي : لا يوجد.

○ التأثيرات الجانبية : لا يوجد

○ طريقة الاستعمال : عن طريق الفم مع ماء الشرب .

الدواجن : 200 مل / 200 لتر ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام .

العجول : 200 مل / 100 لتر ماء الشرب .

الاغنام و الماعز : 30 - 70 مل / 100 لتر ماء الشرب .

الارانب : 250 مل / 100 لتر ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام .

الجرعات
و مدة
العلاج

○ الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م.



1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

ORAL
SOLUTION

Jamma Antitox



غاما انتي توكس

سائل عن طريق الفم

الاستطباب:

يستخدم غاما انتي توكس كمضاد للفطور حيث يوقف نمو الفطور وابواغ و تكاثرها على الغذاء والمكونات الغذائية في القناة الهضمية ، ايضاً يوقف التأثيرات الجانبية للفطور في الحيوانات من خلال إيقاف امتصاص السموم الفطرية .

مضادات الاستطباب:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

التفاعل الدوائي:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

التأثيرات الجانبية:

لا يوجد عند الالتزام بالجرعات الموصى بها .

طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب و يمكن ان يرش على العلف .

الجرعات
و مدة
العلاج

50 مل/200 لتر ماء شرب لمدة 3 ايام و إذا اقتضت الحاجة
تعدد لعدة 5 ايام .

يمكن ان يرش على العلف بواقع 1 لتر / طن علف .

فترة السحب: لا يوجد .

الحفظ: يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م .

Warnings

يرجى اخذ الحذر الشديد عند استعمال المستحضر لانه يسبب حروق جلدية و اذيات عينية فتحضر في حال الملامسة غسل الوجه و العينين جيداً بالماء العذب .

1000 ml

Jamma E-Selenium

سائل عن طريق الفم

غاما
إي سيلينيوم



○ التركيب:

كل 1 مل يحتوي على:
فيتامين (E) 50 ملجم
سيليسيوم 1.8 ملجم
سواغات حتى 1 مل

الاستطباب

يعتبر فيتامين ه ضروري للعديد من الوظائف الفيزيولوجية و يعتبر مضاد أكسدة خلوي و يحمي الجدران الخلوية.

يستخدم هذا المستحضر في الحالات التالية:

- عند الطيور: نقص فيتامين ه او السيليسيوم، زيادة الخصوبة، هرث الصوص المجنون و الذي يتميز بالرنح و فقد التوازن و الحركة الغير طبيعية، انخفاض إنتاج البيض و تدني نسبة الفقس، ضمور العضلات عند الصيصان و الديك الرومي، الارتشاحات تحت الجلد.
- عند الابقار و الاغنام و الماعز: هرث اعتلال العضلات او هرث العصلة البيضاء، نقص الخصوبة عن الذكور و الاناث، حالات نقص فيتامين ه و السيليسيوم.

○ مضادات الاستطباب:

زيادة استهلاك السيليسيوم يؤدي إلى ترسبيه في البيض مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الفقس.

○ طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم مع ماء الشرب.

الدواجن: 1 مل/10 لتر من ماء او 20 مل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 أيام متتالية.

الابقار و الاغنام و الماعز: 25 مل باليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية.

الجرعات
ومدة
العلاج

○ فترة السحب:

لا يوجد.

○ الحفظ:

يحفظ في مكان مظلم و جاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °C.

1000 ml

JAMMA FOR VETERINARY MEDICINES INDUSTRY

Vita Jam

ORAL SOLUTION



فيتا جام

سائل عن طريق الفم

الاستطبابات :

1. علاج حالات نقص الفيتامينات A, D3, E, س.سي.
2. تنشيط عمليات الاستقلاب عند البدء بانتاج البيض.
3. زيادة الفقس و الخصوبة و رفع مقاومة الطيور.
4. في حالات الاجهاد الناتجة عن الحرارة العالية او الجو البارد.
5. يستخدم بعد التلقيح الوفاني لزيادة المقاومة و فعالية اللقاح.
6. بعد العلاج من الكوكسیديا.
7. في حالات الكساح و تشهّرات العظام.
8. فقدان الشهية.

○ مضادات الاستطباب / التداخلات الدوائية : لا يوجد .

○ الآثار الجانبية / فترة السحب : لا يوجد .

○ طريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب .

الدواجن : 200 مل لكل 200 لتر
ماء شرب لمدة 5.4 أيام .

العجول و الحملان : 8 مل للحيوان .
الابقار و الخيول : 15 مل للحيوان .
الحيوانات الصغيرة : 3 مل للحيوان .

الجرعات
ومدة
العلاج

الحفظ:
يحفظ في مكان مظلم و جاف
و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25°C .

1000 ml

ميـنـيرـالـ جـامـ

برـيمـكـسـ

دواـعـمـ عـلـفـيـةـ مـخـتـلـفـةـ

Mineral jam primex

Feed Additive



التركيب:

تحتوي كل 1000 غ على:

5 غ	أوكسيد المنغنيز
7.5 غ	سلفات الزنك
30 غ	سلفات الحديد
1.75 غ	سلفات النحاس
0.15 غ	سلفات الكوبالت
35 ملغم	يود (يود البوتاسيوم)
25 ملغم	سيلينيت الصوديوم
1000 غ	كربيونات الكالسيوم حتى

الاستطباب:

يسـعـمـكـ مـيـنـيرـالـ جـامـ فيـ عـلـاجـ حـالـاتـ نـقـصـ المـعـادـنـ وـ الشـوـارـدـ فـيـ الـغـذـاءـ وـ فـيـ حـالـاتـ الـإـسـهـاـنـ الـتـيـ تـنـرـافـقـ مـعـ نـقـصـ الشـوـارـدـ الـمـعـدـنـيـةـ وـ لـمـحـافـظـةـ عـلـىـ الدـواـجـنـ وـ الـموـاـشـيـ فـيـ صـحـةـ جـيـدةـ وـ زـيـادةـ إـنـتـاجـ وـ رـفـعـ الـخـصـوبـةـ.

- مضـادـاتـ الـاسـطـبابـ / التـفاعـلـاتـ الدـوـائـيـةـ : لاـ يـوجـدـ.
- التـأـثـيرـاتـ الجـانـبـيـةـ : لاـ يـوجـدـ.
- طـرـيقـةـ الـاسـتـعـمـالـ: يـعـطـيـ مـذـلـوـطـاـ بـالـعـلـفـ.

الجرعـاتـ وـمـدـدـةـ العـلاـجـ

1 كـمـ / طـنـ عـلـفـ
أـوـ حـسـبـ إـرـشـادـاتـ الطـبـبـ الـبـطـريـ.

- فـتـرـةـ السـحبـ: لاـ يـوجـدـ.

● الحـفـظـ:

يـحـفـظـ فـيـ مـكـانـ مـظـلـمـ وـ جـافـ
وـ بـرـدـةـ حرـارـةـ لاـ تـزـيدـ عـنـ 25ـ مـ.

1000 غ

Vita Jam fattening

Feed Additive

فيتا جام
تسمين

دواجم علفية مختلفة

الاستطباب :

يُفَيِّد في تعويض النقص الحاصل في الفيتامينات والمعادن المعدنية الأساسية في العضوية والتي تصاحب الحالات المرضية وسوء التغذية و يستعمل في حالات الضعف العام والاجهاد و يُفَيِّد في إدرار الحليب ، زيادة النمو و الكفاءة التحويلية (تسمين العجول والخراف) ، العلش البيلي والرخاوة المخية وتثبيت الكالسيوم .



التركيب

تحتوي كل 1000 غ على:	
فيتامين A	3 م.م.د
فيتامين D3	0.55 م.م.د
فيتامين E	2 غ
منغنز (أوكسيد المغنىز)	2 غ
فوسفور (ديكالسيوم فوسفات)	5 غ
صوديوم (كلوريد الصوديوم)	150 غ
مغنيزيوم (سلفات المغنيزيوم)	20 غ
زنك (أوكسيد الزنك)	20 غ
حديد (سلفات الحديد)	4 غ
يود (يوديد البوتاسيوم)	10 هلم
كوبالت (سلفات الكوبالت)	20 هلم
سيلينيوم (سيلينيت الصوديوم)	10 هلم
كربيونات الكالسيوم حتى	1000 غ

○ مضادات الاستطباب / التفاعلات الدوائية : لا يوجد .

● الآثار الجانبية : لا يوجد .

● طريقة الاستعمال: يعطي مخلوطاً بالعلف .

○ الجرعات ومدة العلاج :

كافية الحيوانات :
2.1.5 كغم / طن علف
او حسب إرشادات الطبيب البيطري .

○ فترة السد : لا يوجد .

○ الحفظ :

يحفظ في مكان مظلم وجاف و بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 °م.

١٠٠٠ غ